


Estudo VOSO avalia a eficiência do tratamento com dose padrão de azacitidina, assim como a quantidade e o tempo de ciclos, em pacientes com SMD e LMA.

Resultados:

A eficácia máxima da azacitidina está associada à dose padrão (75 mg/m²/d por 7 dias), em comparação com a dose diária de 100 mg/m²/d por 5-7 d (P = 0,0005) em pacientes com SMD e LMA.



(P = 0,0005)

* CR = remissão completa/RP = remissão parcial/HI = melhora hematológica

Em geral, a mediana de 4 ciclos de azacitidina (intervalo de 1 a 12) foi necessária para atingir a resposta.

Taxa de resposta geral, incluindo CR, PR e HI*:

Sobrevida Global Mediana:

56,5%

**17,1
meses**

* CR = remissão completa/RP = remissão parcial/HI = melhora hematológica

A continuação do tratamento com azacitidina é indicada para maximizar o número e a qualidade da resposta.

23%

dos pacientes necessitaram de mais de 6 ciclos para atender aos critérios de resposta.

Referência: 1. Voso M.T., Niscola P., Piciocchi A., et al. Standard dose and prolonged administration of azacitidine are associated with improved efficacy in a real-world group of patients with myelodysplastic syndrome or low blast count acute myeloid leukemia. Eur J Haematol 2016; 96: 344–351.

Antes de prescrever qualquer medicamento eventualmente citado, recomendamos a leitura da bula completa emitida pelo fabricante e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA) - <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/>