

Cerca de 92% dos pacientes com SMD de alto risco em tratamento com azacitidina obtêm sua melhor resposta no ciclo 12

O prognóstico de pacientes com SMD definida em intermediária-2 ou alto risco pelo IPSS (International Prognostic Scoring System) é ruim, com uma sobrevida mediana de 1,2 anos e 0,4 anos, respectivamente. A maioria dos óbitos é atribuída a infecções, hemorragia, complicações relacionadas à anemia, transfusões ou evolução da SMD para LMA.

Neste estudo foi relatado que, dos 179 pacientes designados para tratamento com AZA, 91 (51%) alcançaram resposta (completa, parcial ou melhora hematológica). Pacientes responsivos receberam uma média de 14 ciclos de azacitidina e no geral, 91% dos pacientes alcançaram suas primeiras respostas com 6 ciclos. Dos 9% de pacientes restantes, todos alcançaram suas primeiras respostas em 12 ciclos, exceto 1 paciente que teve uma primeira resposta no ciclo 16.

A proposta desta segunda análise do estudo AZA-001 foi **proporcionar um melhor entendimento do tempo e do padrão de resposta ao tratamento com AZA em pacientes com SMD de alto risco**. Considerando que 91% das primeiras respostas ocorreram em 6 ciclos, os dados deste estudo sugerem que resultados com azacitidina devem ser avaliados depois de um período mínimo de 6 ciclos de tratamento.

Consulte a bula



Referência bibliográfica: Silverman et al, Continued Azacitidine Therapy Beyond Time of First Response Improves Quality of Response in Patients With Higher-Risk Myelodysplastic Syndromes, Cancer. 2011 June 15, 117(12): 2697–2702.
Setembro/2022

SAC 0800 87 89 055
carebrasil@drreddys.com

Dr.Reddy's