


Guideline ESMO recomenda o uso de azacitidina após analisar orientações de prática para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com alto e baixo risco de SMD.


Resultados

Os dois quadros apresentados (abaixo) detalham orientações para tratar pacientes com alto e baixo risco de SMD, trazendo algumas pontuações:

- **azacitidina** é recomendada [I, A] para pacientes com SMD de alto risco sem comorbidades importantes que não são imediatamente elegíveis para alo-SCT;
- o uso de **azacitidina** pode ser preferível em comparação com o HMA alternativo, decitabina. Os resultados do ensaio randomizado mostraram que a **azacitidina** foi superior aos regimes de tratamento convencionais [cuidados de suporte, citarabina em baixa dosagem (LDAC) e quimioterapia semelhante a AML];
- pelo menos 6 cursos são recomendados como parte do esquema: **azacitidina** 75 mg/m²/dia por via subcutânea por 7 dias consecutivos a cada 28 dias [II, B].



Algoritmo terapêutico para SMD de risco mais alto.



Algoritmo terapêutico para SMD de risco mais baixo.

Referência: Fenaux P., Haase D., Santini V., et al. Myelodysplastic syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology* 2021; 32: 142–156.

Antes de prescrever qualquer medicamento eventualmente citado, recomendamos a leitura da bula completa emitida pelo fabricante e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/>